



Wallonie

**AViQ**

Agence pour une Vie de Qualité

Familles Santé Handicap

# Diphtérie



## Importance en Santé Publique

Historiquement, la diphtérie a été l'une des maladies infantiles les plus redoutées, se caractérisant par des flambées dévastatrices. Grâce à la vaccination, l'incidence de la diphtérie a considérablement diminué en Belgique : elle est passée de 7412 cas dont 370 décès entre 1950 et 1959, à moins de 15 cas entre 1980 et 2012. Dix cas ont été rapportés entre 2012 et 2016.

La diphtérie est une maladie difficile à éliminer car, si le vaccin protège efficacement contre les manifestations dues à la toxine, il n'empêche pas la colonisation du nasopharynx, même chez les sujets vaccinés. Aujourd'hui, la maladie reste endémique dans plusieurs pays de différentes régions du monde (Asie du Sud-est, Afrique, Moyen orient, Amérique du Sud, Caraïbes et Europe de l'est), posant une menace constante pour les populations à faible niveau de séro-protection (ce qui est le cas en Belgique pour les adultes de >40ans en Belgique) et les sujets non ou incomplètement vaccinés.

La diphtérie est une maladie causée par les corynebactéries du complexe diphtérieae (*C. diphtérieae*, *C. ulcerans* et *C. pseudotuberculosis*). Au cours des 10 dernières années, seuls des cas sporadiques sont rapportés en Belgique et les pays avoisinants. Si les cas de *C. diphtérieae* sont généralement importés de zones endémiques, les cas de *C. ulcerans* sont fréquemment autochtones (maladie transmise par les animaux de compagnie tels que les chats ou les chiens). Le *C. ulcerans* se présente donc comme une maladie zoonotique émergente, menace qui semblait être contrôlée ces 20 dernières années.

Les mesures à prendre **sont urgentes** devant un cas isolé. Non seulement en termes de traitement du cas (antitoxine tétanique à donner endéans les 48heures), mais aussi en termes de mesures à prendre vis-à-vis de l'entourage afin de limiter la circulation du bacille.

## Rôle du médecin traitant et/ou déclarant

### 1. Déclarer :

Tout cas suspect de **diphtérie** sera déclaré à la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'AViQ dans les 24 heures.

Il existe actuellement trois voies de déclaration possibles :

- Par téléphone: 071/33.77.77
- Par voie électronique, en cliquant directement [ici](#)
- Par email à l'adresse suivante : [surveillance.sante@avig.be](mailto:surveillance.sante@avig.be)

### 2. Evaluer avec l'inspecteur les mesures prises et à prendre pour le patient et son entourage

## Mesures de contrôle prises par la cellule de surveillance des maladies infectieuses

Les mesures à prendre sont urgentes et concernent non seulement le cas mais également son entourage afin d'empêcher la transmission et la diffusion du bacille diphtérique :

1. **Mesures chez le malade** : S'assurer de la mise en isolement du cas-index suspect jusqu'à l'obtention des résultats du laboratoire (isolement respiratoire si infection ORL et/ou protection mécanique de la plaie si infection cutanée).

## 2. Enquête épidémiologique :


### Si *C. diphtheriae* tox +

- Recherche de la source d'infection:
  - Rechercher un contact avec des personnes en provenance de zones à haute endémie ou avec, le cas échéant, des personnes dont l'historique vaccinal est inexistant ou incomplet ;
  - Rechercher de personnes avec lésions cutanées chroniques ;
- Identification des personnes ayant présenté des contacts à haut risque avec le malade, durant les 7 jours qui ont précédé le début de la symptomatologie (forme ORL) ou depuis l'apparition de la plaie (forme cutanée) : les personnes vivant sous le même toit ; les personnes ayant passé  $\geq 4$  heures dans le même lieu confiné dont le voyage en transport en commun (uniquement si forme ORL) ; les personnes ayant eu des contacts intimes avec le cas index ; le personnel de santé exposé aux sécrétions oro-pharyngées ou ayant réalisé des manœuvres invasives dont l'intubation (forme ORL) ou ayant réalisé les soins de plaies (forme cutanée) ; le milieu collectif ou professionnel (à envisager au cas par cas).
- S'assurer de la bonne prise en charge des personnes à risque :
  - Frottis nasopharyngé, frottis de gorge (et frottis de plaie si présente) ;
  - Antibio prophylaxie ;
  - Vaccination en cas d'historique incomplet ou douteux.

### Si *C. ulcerans* tox +

- Recherche de la source d'infection:
  - Rechercher un contact avec des bovidés, chevaux, chiens, chats ;
    - Si prélèvement possible et positif : recommandation de traitement de l'animal ;
    - Si prélèvement impossible, recommandation de traitement d'emblée de la source suspecte.
  - Rechercher une consommation de produits à base de lait non pasteurisé.
- Identification des personnes ayant présenté des contacts à haut risque avec le malade, durant les 7 jours qui ont précédé le début de la symptomatologie (forme ORL) ou depuis l'apparition de la plaie (forme cutanée) : les personnes vivant sous le même toit ; les personnes ayant passé  $\geq 4$  heures dans le même lieu confiné dont le voyage en transport en commun (uniquement si forme ORL) ; les personnes ayant eu des contacts intimes avec le cas index ; le personnel de santé exposé aux sécrétions oro-pharyngées ou ayant réalisé des manœuvres invasives dont l'intubation (forme ORL) ou ayant réalisé les soins de plaies (forme cutanée) ; le milieu collectif ou professionnel (à envisager au cas par cas) ; les personnes ayant eu des contacts avec la source animale suspectée.
- S'assurer de la bonne prise en charge des personnes à risque :
  - Frottis nasopharyngé, frottis de gorge et frottis de plaies ;
  - Antibio prophylaxie ;
  - Vaccination en cas d'historique incomplet ou douteux.

Figure : Présentation classique de la maladie



## Agent pathogène

<b>Germe</b>	Bacille à Gram positif aérobie du genre <i>Corynebacterium</i> avec 3 espèces concernées par la diphtérie : <i>C. diphtheriae</i> , <i>C. ulcerans</i> , <i>C. pseudotuberculosis</i> . Bactéries porteuses ou non du gène codant la toxine diphtérique ("tox+" ou "tox-"), responsable de complications myocardiques et neurologiques périphériques.
<b>Réservoir</b>	Humain et animal.
<b>Résistance Physico-chimique</b>	Inhibition par la chlorhexidine (Concentration Minimale Inhibitrice de 5mg/l). Inactivation par l'hypochlorite de sodium à 1 %, l'éthanol à 70 %, le glutaraldéhyde, le formaldéhyde, les produits iodés, le peroxyde d'hydrogène, l'acide peracétique et les composés d'ammonium quaternaire, le traitement à la chaleur humide (121 °C pendant au moins 15 minutes) et à la chaleur sèche (160 à 170 °C pendant au moins 1 heure).

## Clinique

<b>Transmission</b>	Par des gouttelettes provenant des voies aériennes supérieures ; Par contact direct avec des plaies infectées (homme ou animal) ; Par ingestion (produits à base de lait cru) ; Existence de porteurs sains.
<b>Incubation</b>	De 2 à 5 jours, jusqu'à 7 jours.
<b>Période de contagiosité</b>	2 semaines environ (contagiosité importante), voire des mois à partir d'un porteur sain (contagiosité prolongée mais faible).
<b>Symptômes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Infection ORL :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diphtérie « classique » : angine pseudo-membraneuse (fausses membranes extensives sur les amygdales et la luette et des adénopathies satellites parfois volumineuses - bull neck) <b>OU</b></li> <li>- Angine ressemblant à une angine à streptocoques (surtout chez les personnes vaccinées) <b>OU</b></li> <li>- Atteinte nasale pure avec écoulements purulents et fausses membranes.</li> </ul> </li> <li>▪ Formes cutanées ou cutanéomuqueuses (parfois méconnues) ;</li> <li>▪ Adénite nécrosante (liée à <i>C. pseudotuberculosis</i>) ;</li> <li>▪ Très rarement : formes atypiques : génitales, oculaires ou auriculaires.</li> </ul>
<b>Complications</b>	<p><i>Locales</i> : asphyxie par obstruction des voies aériennes supérieures par les fausses membranes (croup)</p> <p><i>Formes invasives liées à la production de toxine</i> :</p> <p>Les plus courantes : polynévrite régressive, myocardite.</p> <p>Moins fréquentes : insuffisance rénale aiguë, thrombocytopenie.</p> <p><i>Chez personnes immunodéprimées</i> : septicémies, endocardites, arthrites.</p>

<b>Diagnostic</b>	
<b>Diagnostic biologique</b>	Confirmation du diagnostic par culture. Recherche de du gène <i>tox</i> (pcr) et de la production de toxines (test elek)
<b>Définition de cas de l'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)<sup>1</sup></b>	
<b>Critères de diagnostic</b>	<p><b>Critères cliniques</b> Tout sujet présentant au moins une des formes cliniques suivantes:</p> <p><u>Diphthérie respiratoire classique:</u> Affection des voies respiratoires supérieures caractérisée par une laryngite, par une rhinopharyngite ou par une amygdalite ET une membrane/pseudomembrane adhérente ;</p> <p><u>Diphthérie respiratoire modérée :</u> Affection des voies respiratoires supérieures caractérisée par une laryngite, par une rhinopharyngite ou par une amygdalite SANS membrane/pseudomembrane adhérente ;</p> <p><u>Diphthérie cutanée :</u> Lésion cutanée ;</p> <p><u>Autres formes de diphthérie :</u> Lésion de la conjonctive ou des muqueuses.</p> <p><b>Critères de laboratoire</b> Isolement de <i>C. diphtheriae</i>, <i>C. ulcerans</i> ou <i>C. Pseudotuberculosis toxigène</i> à partir d'un échantillon clinique.</p> <p><b>Critères épidémiologiques</b> Au moins un des liens épidémiologiques suivants : - Transmission interhumaine ; - Transmission de l'animal à l'homme.</p>
<b>Cas possible</b>	Toute personne répondant aux critères cliniques de la diphthérie respiratoire classique.
<b>Cas probable</b>	Toute personne répondant aux critères cliniques de diphthérie (toute forme) et présentant un lien épidémiologique avec un cas confirmé humain ou avec un cas de transmission de l'animal à l'homme.
<b>Cas confirmé</b>	Toute personne répondant aux critères de laboratoire ET présentant au moins une des formes cliniques.
<b>Epidémiologie</b>	
<b>Groupe d'âge</b>	Tout âge.
<b>Incidence</b>	L'incidence mondiale estimée de la diphthérie approchait les 10 000 cas par an pour la période de 2000-2004, et s'est réduite à 5288 cas par an pour la période 2005-2009. Une stabilisation est observée depuis lors. En Europe de l'Ouest, quelques cas sporadiques sont décrits, d'importation à <i>C. diphtheriae</i> et autochtones à <i>C. ulcerans</i> . En Belgique, 10 cas ont été rapportés entre 2012-2016, majoritairement des <i>C. ulcerans</i> .
<b>Immunité</b>	Immunité naturelle : maladie pas toujours immunisante. Immunité vaccinale décroissante avec le temps (10 ans).
<b>Saisonnalité</b>	Hiver – Printemps.

<sup>1</sup> European Centre for Diseases Prevention and Control:  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:159:0046:0090:FR:PDF>



<b><u>Géographie</u></b> <b><u>Sex-ratio</u></b>	Régions endémiques ou rapportant encore des épidémies : Asie du Sud-Est asiatique (Thaïlande, Inde, Indonésie, Népal, Philippines, Laos) et, à un moindre degré, l'Amérique du Sud et le caribbes (Brésil, Equateur, Haïti, République dominicaine), le Moyen-Orient, l'Afrique (Algérie, Madagascar, Zambie, Nigeria, Afrique du Sud, Soudan) et l'Europe de l'est.
<b>Populations à risque</b>	
<b><u>Groupes à risques de développer la maladie</u></b>	Personnes non vaccinées ou ayant des titres d'anticorps non protecteurs ; Voyageurs en pays d'endémique, personnels de laboratoire, personnels de santé ou s'occupant de personnes en situation de précarité, vétérinaires et toute personne en contact régulier avec des animaux.
<b><u>Groupes à risque de développer des formes graves</u></b>	Immunodéprimés, alcooliques, dénutris.
<b><u>Grossesse allaitement</u></b>	N/A.
<b>Prise en charge du patient</b>	
<b><u>Traitement</u></b>	Hospitalisation, antitoxine diphtérique et traitement antibiotique. Vaccination contre la diphtérie à distance de l'épisode infectieux.
<b><u>Mesures d'Hygiène</u></b>	Appliquer les <a href="#">mesures d'hygiène générale</a> et les <a href="#">mesures d'hygiène spécifiques aux maladies à transmission aéroportée</a> , disponibles sur ce site.
<b><u>Précautions additionnelles</u></b>	Jusqu'à l'obtention de deux frottis négatifs (isolement respiratoire si infection ORL et uniquement protection mécanique de la plaie si infection cutanée avec portage ORL exclu).
<b>Prise en charge de l'entourage du patient (post-exposition)</b>	
<b><u>Prophylaxie</u></b>	Identification des contacts à risque (diffère selon l'espèce de corynebactérie impliquée et la forme clinique de l'infection (ORL versus cutanée). Frottis nasopharyngé et frottis de gorge (et frottis de plaie(s) si présente(s)) chez les contacts à risque identifiés; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si cas index <i>C. diphteriae</i> tox+ (forme ORL ou cutanée) : antibioprofylaxie immédiate pour tous les contacts à risque, sans attendre le résultat de la culture</li> <li>▪ Si cas index <i>C. ulcéans</i> tox+ de forme ORL : antibioprofylaxie immédiate sans attendre résultat culture si le sujet contact est à risque de développer une forme grave.</li> <li>▪ Pour les autres situations : antibioprofylaxie uniquement si dépistage du contact revient positive pour souche tox+tox+</li> </ul> Vaccination en cas d'historique incomplet ou douteux.
<b><u>Mesures d'Hygiène</u></b>	Appliquer les <a href="#">mesures d'hygiène générale</a> et les <a href="#">mesures d'hygiène spécifiques aux maladies à transmission aéroportée</a> , disponibles sur ce site.
<b><u>Précautions additionnelles</u></b>	Si personnes de l'entourage dépistées positives, même type d'isolement que pour le cas index.
<b><u>Collectivité à risque</u></b>	Action de prévention à entreprendre si le cas est en milieu collectif. <b>Contactez le <a href="#">médecin inspecteur</a>.</b>
<b>Prévention pré-exposition</b>	
<b><u>Mesures préventives générales</u></b>	Appliquer les <a href="#">mesures d'hygiène générale</a> et les <a href="#">mesures d'hygiène spécifiques aux maladies à transmission aéroportée</a> , disponibles sur ce site. Rappel de vaccination à faire avant un voyage en pays endémique.
<b><u>Prophylaxie</u></b>	NA
<b><u>Vaccination</u></b>	Anatoxine diphtérique inactivée n'étant disponible qu'en vaccin combiné ; Schéma vaccinal recommandé chez l'enfant : à 2, 3, 4 et 15 mois (vaccin hexavalent) puis rappel à 6 ans (vaccin tétravalent), à 16 ans et ensuite tous les 10 ans ;

	Primo-vaccination complète contre la diphtérie chez l'adulte nécessitant trois injections: deux injections à 4-6 semaines d'intervalle suivies d'une 3ème injection 6 mois à 1 an après la deuxième injection.
<b>Annexes</b>	
<a href="#">Annexe 1</a>	Tableau récapitulatif de la prise en charge du cas index
<a href="#">Annexe 2</a>	Procédure de commande de l'antitoxine antidiphtérique
<a href="#">Annexe 3</a>	Notice de l'antitoxine anti diphtérique
<a href="#">Annexe 4</a>	Algorithme de prise en charge de l'entourage

## 1. Agent pathogène

### - Germe :

Corynebacterium du complexe diphtheriae. Trois espèces existent :

- *C. diphtheriae* (dont 4 biovars : *mitis*, *gravis*, *intermedius*, *belfanti*);
- *C. ulcerans* ;
- *C. pseudotuberculosis*

### - Réservoir :

Le réservoir de *C. diphtheriae* est presque exclusivement humain (dans de rares cas, la bactérie a été isolés chez des chevaux et des chats). Dans les pas tropicaux, les diphtéries cutanées sont probablement des réservoirs de l'infection.

Les infections à *C. ulcerans* et à *C. pseudotuberculosis* sont des zoonoses et l'homme semble être un hôte occasionnel:

- *C. ulcerans* : animaux domestiques (chats et chiens), vaches, cochons, singes, chevaux, etc. ;
- *C. pseudotuberculosis* : caprins.

### - Résistance physico-chimique :

*C. diphtheriae* et les espèces apparentées peuvent être inhibées par la chlorhexidine (CMI de 5mg/l). On ne dispose pas de renseignements précis sur *C. diphtheriae* et les espèces apparentées, mais la plupart des bactéries végétatives peuvent être inactivées par : l'hypochlorite de sodium à 1%, l'éthanol à 70 %, le glutaraldéhyde, le formaldéhyde, les produits iodés, le peroxyde d'hydrogène, l'acide peracétique et les composés d'ammonium quaternaire. Un traitement à la chaleur humide (121 °C pendant au moins 15 minutes) et à la chaleur sèche (160 à 170 °C pendant au moins 1 heure).

### - Pathogénèse :

#### ▪ **Colonisation de l'oropharynx**

Après transmission interhumaine par contact direct avec un patient ou un porteur sain, *C. diphtheriae* colonise et envahit la muqueuse de l'oropharynx sans dissémination, induisant la formation de fausses membranes extensives dues à une intense réaction inflammatoire constituée d'un tapis de polynucléaires insérées dans de la fibrine. *C. diphtheriae* est une bactérie à multiplication extracellulaire capable de résister à la phagocytose. Certaines protéines de surface (antigènes K spécifiques de type) sont des adhésines et jouent un rôle anti-phagocytaire. Les bactéries produisent un glycolipide toxique (dimycolate de tréhalose) contribuant à l'inflammation locale.

#### ▪ **Toxine diphtérique**

La toxine diphtérique est une exotoxine protéique de 62 kDa, sécrétée en croissance exponentielle et inhibant la synthèse protéique des cellules de tous les tissus de l'hôte infecté (toxine pantrope). C'est

une pro-enzyme avec 3 domaines: un domaine de fixation aux récepteurs, un domaine hydrophobe de translocation à travers la membrane endosomale, et un domaine enzymatique (la sous-unité A de 21 kDa). La toxine se fixe à un récepteur cellulaire: le pro-HB-EGF (heparine-binding EGF-like growth factor) et aux co-récepteurs CD-9 et HSPG (heparan-sulfate-proteo-glycan). La toxine est internalisée par les endosomes puis libérée dans le cytoplasme après protéolyse révélant son activité enzymatique ADP-ribosylase.

La toxine diphtérique est codée par le gène *tox*, porté par un phage  $\beta$ . Les phages (virus infectant les bactéries) peuvent transférer certains gènes entre différentes populations bactériennes. Par ce mécanisme, le gène *tox* peut être acquis par les différentes espèces de corynebacterium (*diphtheriae*, *ulcerans* et *pseudotuberculosis*).

La production de toxine est contrôlée par le gène *toxR* localisé sur le chromosome bactérien. La protéine ToxR est un répresseur actif uniquement en présence de fer ( $> 100 \mu\text{g/l}$ ). En l'absence de fer, la toxine est produite en fortes quantités, ce qui correspond bien aux conditions de survie dans les sécrétions oro-pharyngée où le fer disponible est en très faible quantité.

## 2. Clinique

### - Transmission :

Le mode de transmission diffère selon l'espèce :

#### ▪ *C. diphtheriae*:

Transmission interhumaine ou, plus rarement, environnementale.

La transmission se réalise par l'intermédiaire des **gouttelettes provenant des voies aériennes supérieures**, générées par la toux, les éternuements ou encore la parole d'un sujet infecté ou d'un porteur sain. Plus rarement, la transmission peut avoir lieu par contact direct des muqueuses avec des mains souillées par les sécrétions oro-pharyngées infectées, ou par un support inerte souillé par la salive (jouets, livres, literie).

La transmission par **contact direct à partir de lésions cutanées** est également décrite. Ces diphtéries cutanées sont souvent importées (acquis en dehors de la Belgique, dans des pays endémique). Tant les cas de diphtérie cutanée que leurs contacts peuvent développer une diphtérie respiratoire.

#### ▪ *CB ulcerans* et *C. pseudotuberculosis*:

Transmission par contact avec animaux infectés (chiens, chats, bovins, chevaux et autres mammifères pour *C. ulcerans*, caprins pour *C. pseudotuberculosis*). Un contact avec la salive des animaux infectés (lechage de plaie) est un facteur de risque d'infection par *C. ulcerans*.

La contamination peut se faire également à partir de consommation de lait non pasteurisé contaminé par des lésions des mamelles des vaches pour *C. ulcerans* et de chèvres pour *C. pseudotuberculosis*.

Si la transmission interhumaine de *C. ulcerans* ou *C. pseudotuberculosis* reste non établie à ce jour, des éléments indirects sont en sa faveur (découverte de portage asymptomatique autour du cas index).

### - Incubation :

Courte de 2 à 5 jours, inférieure à 7 jours.

- **Période de contagiosité :**

La période de contagiosité est généralement  $\leq 2$  semaines (période de contagiosité importante), et rarement au-delà de 4 semaines dans le cas des formes respiratoires.

Dans les rare cas de portage chronique, la période de contagiosité peut s'étendre au-delà de 6 mois sans traitement adéquat (contagiosité prolongée mais faible). Une antibiothérapie efficace interrompt promptement la contagiosité (24-48h).

- **Symptômes :**

Le portage asymptomatique de la bactérie est commun dans les régions endémiques : c'est d'ailleurs un important réservoir qui permet la circulation des bactéries dans la population générale.

■ **Infection ORL :**

Celle-ci peut prendre plusieurs formes :

- **Diphthérie « classique » :** Après une incubation de 2 à 7 jours, la maladie débute insidieusement, avec des malaises, de la fièvre modérée et une angine banale. Ensuite, une angine pseudomembraneuse apparaît, avec des fausses membranes extensives sur les amygdales et la luette et des adénopathies satellites parfois volumineuses (bull neck). Les fausses membranes typiques sont le plus souvent blanchâtres, grisâtres, très adhérentes. Elles ne sont pas systématiquement présentes. L'extension des fausses membranes est corrélée à la sévérité des symptômes (risque d'obstruction des voies aériennes par extension au larynx et à la trachée, croup).



Source: DIPNET: <http://www.immunize.org/photos/diphtheria-photos.asp>

- **Atteinte nasale avec écoulements purulents et/ou sanglants et fausses membranes :** l'atteinte est limitée à la partie nasale antérieure ; les symptômes sont d'intensité moyenne et les effets toxinogènes sont rares.
- **Angine ressemblant à une angine à streptocoques** (surtout chez les personnes vaccinées).

■ **Formes cutanées ou cutanéomuqueuses (parfois méconnues)**

La forme cutanée se caractérise par une ulcération évolutive douloureuse, parfois recouverte d'une croûte ou de fausses membranes, se présentant sur une plaie préexistante (piqûre, ulcération, blessure). Les lésions peuvent être multiples.

Le diagnostic microbiologique est rendu difficile, dû au fait d'une présence de flore polymicrobienne. Les complications liées à la toxine (voir [ci-dessous](#)) sont moins fréquentes que pour les formes ORL.





Source: <http://www.immunize.org/photos/diphtheria-photos.asp>

## ▪ Autres formes cliniques

Des formes génitales, oculaires ou auriculaires existent et sont de diagnostic difficile et sans signe toxique.

Des formes invasives (se présentant chez les patients immunodéprimés) peuvent survenir sous forme de septicémies, endocardites, arthrites.

Une adénite nécrosante (liée à *C. pseudotuberculosis*) peut apparaître sous forme d'atteinte ganglionnaire.

On notera que des infections par *C. diphteriae* **non productrices de toxines** ont été associées à des infections ORL et cutanée récurrentes chez des sujets immunodéprimés, mais aussi à des cas d'endocardites.

## - Complications :

Outre les complications liées à l'**obstruction des voies aériennes supérieures** pouvant être létales (croup), la gravité de l'infection est liée à la diffusion de l'exotoxine du bacille diphtérique, les sites de prédilection étant le myocarde ainsi que le système nerveux périphérique :

## ▪ **Complications neurologiques :**

La toxine est responsable de paralysies périphériques (polynévrite régressive) apparaissant tardivement, de guérison spontanée en quelques semaines mais pouvant nécessiter une assistance respiratoire.

Les paralysies au niveau ORL sont d'apparition précoce et sont annonciatrices de myocardite.

## ▪ **Complications myocardiques**

La myocardite (associée à des troubles du rythme, à une hypotension) apparaissant après une semaine de symptômes est une complication majeure de la diphtérie, entraînant une létalité importante de par l'insuffisance cardiaque aiguë qui en découle.

Un risque de mort subite existe lors de la phase de convalescence.

## ▪ **Autres complications :**

- signes digestifs avec diarrhée ;
- signes rénaux avec insuffisance rénale aiguë ;
- syndrome hémorragique avec pétéchies cutanéomuqueuses (thrombocytopénie).

## 3. Diagnostic

### - Diagnostic biologique :

La diphtérie doit être évoquée systématiquement devant une angine à fausses membranes ou une ulcération cutanée subaiguë pseudo-membraneuse. Le diagnostic de diphtérie constitue une des urgences du laboratoire de microbiologie. La **culture** est essentielle pour la **confirmation du diagnostic**

de la diphthérie. Un prélèvement devrait être effectué le plus rapidement possible en cas de diphthérie soupçonnée, même si le traitement par antibiotiques a déjà été commencé.

L'isolement s'effectue à partir d'écouvillons de prélèvements rhinopharyngés, de membranes ou de de lésions cutanées. A partir de ces échantillons le plus souvent polymicrobiens, l'isolement des colonies suspectes nécessite un milieu sélectif.

La plupart des isolats cutanés ne sont pas toxigènes. Néanmoins, toutes les corynebactéries du complexe diphtheriae (*diphtheriae*, *ulcerans*, *pseudotuberculosis*) isolées par les laboratoires de microbiologie doivent être adressées au CNR pour la recherche du gène de la toxine et l'identification de l'espèce.

La recherche de la toxinogénèse se fait par recherche du gène (PCR) et de sa production in vitro (test Elek). Ces deux étapes sont nécessaires car certaines corynebactéries du complexe diphthérie peuvent présenter un gène *tox* non fonctionnel (pcr positive mais Elek négatif). Ces souches ne causent pas la diphthérie, mais comme pour les autres souches, pourraient produire une copie fonctionnelle du gène après lysogénéisation par phage.

Un antibiogramme est également réalisé.

#### 4. Définition de cas de l'ECDC

##### - Critère de diagnostic :

##### **Critères cliniques**

Tout sujet présentant au moins une des formes cliniques suivantes:

##### Diphthérie respiratoire classique:

Affection des voies respiratoires supérieures caractérisée par une laryngite, par une rhinopharyngite ou par une amygdalite ET une membrane/pseudomembrane adhérente ;

##### Diphthérie respiratoire modérée :

Affection des voies respiratoires supérieures caractérisée par une laryngite, par une rhinopharyngite ou par une amygdalite SANS membrane/pseudomembrane adhérente ;

##### Diphthérie cutanée :

Lésion cutanée ;

##### Autres formes de diphthérie :

Lésion de la conjonctive ou des muqueuses.

##### **Critères de laboratoire**

Isolement de *C. diphtheriae*, *C. ulcerans* ou *C. pseudotuberculosis* **toxigène** à partir d'un échantillon clinique.

##### **Critères épidémiologiques**

Au moins un des liens épidémiologiques suivants :

- Transmission interhumaine ;
- Transmission de l'animal à l'homme.



Wallonie

# AViQ

Agence pour une Vie de Qualité

Familles Santé Handicap

# Diphtérie



- **Cas possible :**

Toute personne répondant aux critères cliniques de la diphtérie respiratoire classique.

- **Cas probable :**

Toute personne répondant aux critères cliniques de diphtérie (toute forme) et présentant un lien épidémiologique avec un cas confirmé humain ou avec un cas de transmission de l'animal à l'homme.

- **Cas confirmé :**

Toute personne répondant aux critères de laboratoire ET présentant au moins une des formes cliniques.

## 5. Epidémiologie

- **Groupe d'âge :**

Les personnes de tout âge peuvent être atteintes.

Les nouveau-nés sont protégés par les anticorps maternels jusque 6-12 mois.

Dans les pays où la couverture vaccinale reste faible, la diphtérie touche principalement les enfants.

Par contre, à l'échelle mondiale, la répartition selon l'âge évolue, avec une majorité de cas survenant actuellement chez les adolescents et les adultes, conséquence de l'augmentation de la couverture vaccinale chez les enfants.

- **Incidence :**

Historiquement, la diphtérie a été l'une des maladies infantiles les plus redoutées, se caractérisant par des flambées dévastatrices. Bien que la plupart des infections soient asymptomatiques ou montrent une évolution clinique relativement bénigne, de nombreux malades succombaient à une myocardite toxique ou à une obstruction des voies aériennes provoquée par l'atteinte laryngée. Au cours de la grande épidémie de diphtérie qui a sévi en Europe et aux Etats-Unis dans les années 1880, les taux de létalité ont atteint 50% dans certaines régions. Ces taux avaient chuté à environ 15% en Europe au cours de la Première Guerre mondiale, principalement suite à l'utilisation courante du traitement par l'antitoxine. Des épidémies de diphtérie ont également ravagé l'Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale, provoquant environ 1 million de cas (16 000 cas en Belgique) et 50 000 décès en 1943.

Grâce à un programme élargi de vaccination établi en 1974 et l'accessibilité de l'antitoxine diphtérique dans les années 80, l'incidence et la mortalité causée par la diphtérie a baissé de manière spectaculaire à l'échelle mondiale. Le nombre total de cas notifiés a chuté de >90% entre 1980 et 2000. La dernière grande flambée enregistrée est celle qui a sévi en Fédération de Russie et dans les pays de l'ancienne Union soviétique dans les années 1990. Plus de 157 000 cas, dont 5000 mortels, ont été signalés dans la période 1990-1998. La situation s'est améliorée bien qu'il existe encore une circulation de *C. diphtheriae*, notamment en Russie, Ukraine et en Lettonie.


Selon l'OMS, l'incidence mondiale estimée de la diphtérie approchait les 10 000 cas par an pour la période de 2000-2004, et s'est réduite à 5288 cas par an pour la période 2005-2009. Une stabilisation est observée depuis lors. Pour la période 2011-2015, c'est la région de l'Asie du Sud-Est qui a notifié le plus grand nombre d'infections, représentant 55-99% de tous les cas notifiés annuellement. L'Inde et l'Indonésie sont particulièrement touchés (18350 et 3203 cas sur 5 ans respectivement). Malheureusement, des taux de létalité dépassant 10% sont toujours rapportés dans certaines régions du monde, en particulier dans celles où l'anatoxine diphtérique reste indisponible. L'OMS signale par ailleurs une sous-notification des cas de diphtéries pour les régions africaines et la région de la Méditerranée orientale.

Au cours de ces 10 dernières années, les pays de l'Europe de l'Ouest n'ont rapporté que quelques cas sporadiques, le plus souvent d'importation à *C. diphtheriae*, et autochtones à *C. ulcerans*. Le nombre de cas liés à *C. ulcerans* a tendance à augmenter, les personnes touchées rapportant le plus souvent un contact avec un animal domestique. Cette tendance est valable pour la Belgique.

La surveillance de la diphtérie en Belgique repose sur la déclaration obligatoire des cas. La définition des cas, jusqu'alors restreinte à l'identification de *C. diphtheriae* toxigènes, a été élargie par l'ECDC et les Communautés en 2008 aux *C. ulcerans* toxigènes. Grâce à la vaccination généralisée contre la diphtérie depuis 1959, les cas sont aujourd'hui sporadiques et le risque d'épidémie marginal. Selon les dernières études réalisées, la couverture vaccinale pour le DTP3 (3ème dose du vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche) était à Bruxelles de 97,4% en 2019, en Wallonie de 97,7 % en 2019 et en Flandre de 97,0% en 2016.

Entre 2000 et 2018, 16 cas de diphtérie toxigène ont été enregistrés en Belgique. Parmi ces infections, 12 ont été causées par *C. ulcerans* (9 infections cutanées et 3 respiratoires). Pour l'ensemble de ces infections à *C. ulcerans*, l'origine zoonotique est hautement probable (contacts avec des animaux de compagnie). On notera pour l'un de ces cas, dans le cadre du « contact tracing », la détection d'un portage asymptomatique ORL de la même souche tox + de *C. ulcerans* chez une infirmière impliquée dans la prise en charge du patient. Ceci indique une possible transmission interhumaine. Les 4 autres infections rapportées ont été causées par *C. diphtheriae*, 3 avec une forme cutanée et une forme respiratoire. Cette dernière est survenue chez une enfant de 3 ans non vacciné, d'origine tchétchène, n'ayant pas voyagé, et a résulté en son décès suite à des complications cardiaques. La source de contamination est restée non identifiée.

Date of chart: 02 August 2017



Source: WHO/IVB database, 2017  
194 WHO Member States.  
Data as of 19 July 2017



**Figure 1:** Nombre de cas de diphtérie rapporté annuellement et évolution de la couverture vaccinale de DTP3. Source: OMS : <http://www.who.int/topics/diphtheria/en/> ; lien direct [ici](#)

- **Immunité :**

- **Immunité naturelle :** Les patients n'acquièrent pas systématiquement une immunité protectrice après avoir guéri de la diphtérie. Les personnes en phase de convalescence doivent donc recevoir une série complète de vaccination.
  
- **Immunité vaccinale :** Si l'immunité à médiation cellulaire pourrait jouer un rôle, l'immunité contre la maladie dépend principalement de la présence d'anticorps (IgG) contre la toxine diphtérique. Le seuil de protection est fixé à 0,1 UI/ml. Les titres de 0,1 UI/ml ou plus sont pleinement protecteurs et ceux de 1,0 UI/ml ou plus sont associés à une protection à long terme contre la diphtérie. Il est néanmoins arrivé dans de rares cas que la maladie soit observée chez des sujets dont le titre d'anticorps est supérieur au seuil de protection. Les diphtéries survenant chez des personnes vaccinées sont généralement de forme clinique atténuée. Par ailleurs, si le vaccin protège efficacement contre les manifestations dues à la toxine, il n'empêche pas la colonisation du nasopharynx.

Le taux de conversion après la série de primovaccination est de l'ordre de 95 à 98 %. En général, l'immunité est conférée dès la deuxième injection chez l'enfant et persiste au moins cinq ans après le rappel. La durée complète de protection reste méconnue. Néanmoins, l'immunité vaccinale va décroître avec le temps et des rappels du vaccin sont donc nécessaires (établis tous les 10 ans).

Selon une étude réalisée en Belgique en 2006, le taux de séroprotection pour la diphtérie (> 0,1 UI/ml) était sous-optimal dans la population générale (55,2 %), mais était de > 70 % chez les enfants, ce qui devrait être suffisant pour permettre une immunité de groupe. Cette étude montre que seuls 20 à 45 % des patients âgés de 40 ans et plus ont un titre d'anticorps supérieur au seuil considéré protecteur.

- **Saisonnalité :**

Hiver – Printemps.

- **Géographie et sexe ratio :**

En Europe de l'Ouest, seuls quelques cas sporadiques sont décrits, d'importation à *C. diphtheriae* et autochtones à *C. ulcerans*.

D'autres régions restent endémiques ou ont encore rapportés des épidémies depuis 2011 dont le Sud-Est asiatique (Thaïlande, Inde, Indonésie, Népal, Philippines, Laos) et, à un moindre degré, l'Amérique du Sud et le caraïbes (Brésil, Equateur, Haïti, République dominicaine), le Moyen-Orient, l'Afrique (Algérie, Madagascar, Zambie, Nigeria, Afrique du Sud, Soudan) et l'Europe de l'est.

## 6. **Population à risque**

- **Groupes à risque de développer la maladie :**

- Personnes non vaccinées ou ayant des titres d'anticorps non protecteurs ;
- Voyages en pays d'endémie ;
- Personnels de laboratoire, personnels de santé ou s'occupant de personnes en situation de précarité ;
- Vétérinaires et toute personne en contact régulier avec des animaux.

L'hygiène précaire et un terrain débilisé peuvent être des facteurs de risque supplémentaires, notamment dans le cadre des présentations cutanées.

- **Groupes à risque de développer des formes graves :**  
Immunodéprimés, alcooliques, dénutris.

- **Grossesse et allaitement :**  
N/A

## 7. *Prise en charge du patient*

- **Traitement :**

La diphtérie est une **urgence médicale**, notamment du fait du croup et des complications cardiaques. En plus des mesures d'hygiène/isolément requises (cfr paragraphe suivant), la prise en charge du cas comporte 5 volets : les prélèvements microbiologiques adéquats, l'antitoxine diphtérique, l'antibiothérapie, la vaccination, et le contrôle de l'éradication du pathogène. Ceux-ci sont repris dans l'[annexe 1](#).

- **Prélèvements microbiologiques :** de prélèvements multi-sites sont nécessaires afin d'augmenter les chances d'identification du pathogène et confirmation du diagnostic. Il faut donc effectuer :
  - 1 frottis de gorge *et*
  - 1 frottis naso-pharyngé *et*
  - 1 frottis de plaie (si plaie chronique ou diphtérie cutanée)Idéalement, les prélèvements doivent être réalisés avant la mise sous antibiotique, et sous les membranes si celles-ci sont présentes. Des écouvillons bactériologiques standards sont utilisés, et le laboratoire doit être prévenu de l'envoi et de la suspicion clinique.
- **Antitoxine diphtérique :** Il s'agit d'anticorps spécifiques neutralisant les exotoxines diphtériques circulantes dans le tissu et le sang. Cette sérothérapie réduit considérablement le risque de décès et de complications neurologiques ou cardiaques. Cependant, étant inefficace une fois que la toxine est fixée sur ses cellules-cibles, l'administration doit être réalisée **le plus rapidement possible** (endéans les premières 48 heures). De ce fait, l'activation de la **procédure pour la commande d'antitoxine** (cfr [Annexe 2](#)) doit être initiée s'il y a de fortes indications cliniques qu'il s'agit effectivement d'une **diphtérie respiratoire**, sans attendre les résultats microbiologiques.

Il est à signaler que les **diphtéries cutanées** sont rarement à l'origine d'une intoxication à la toxine diphtérique. Le risque lié à l'antitoxine diphtérique est donc souvent considéré comme plus élevé que son bénéfice. Son administration est donc généralement limitée aux situations où l'infection de plaie est causée par *C. diphtheriae tox + et* où le patient est non ou incomplètement vacciné *et* que de signes systémiques évoquant une intoxication sont présents. Néanmoins, tous cas sont discutés avec l'inspecteur de l'AViQ (cfr [annexe 2](#))

L'antitoxine diphtérique étant d'origine équine, un test cutané (ou conjonctival) pour exclure une hypersensibilité doit toujours en précéder l'administration. Pour plus d'informations sur les modalités d'administration, veuillez consulter l'[Annexe 3](#).

- **Antibiothérapie :** Une antibiothérapie doit être immédiatement débutée et éventuellement ajustée en fonction de l'antibiogramme. Selon la sévérité du cas, une mono- ou une bithérapie sera proposée (typiquement macrolide +/- beta lactame).

Des frottis de contrôle (gorge et nasopharynx +/- cutanées) doivent être réalisés afin d'exclure les rares cas de rechutes nécessitant une nouvelle cure d'antibiotiques (cfr contrôle de l'éradication du pathogène).



Wallonie

# AViQ

Agence pour une Vie de Qualité

Familles Santé Handicap

# Diphthérie



- **Vaccination** : Une vaccination systématique sera recommandée en phase de convalescence (après disparition des différents signes cliniques de la maladie) du fait que la maladie est peu immunisante: une dose de vaccin sauf si preuve d'antécédents de primovaccination d'au moins 3 doses avec rappel de moins de 5 ans. Les sujets incomplètement vaccinés recevront ultérieurement les doses additionnelles en fonction du calendrier vaccinal. La vaccination antidiphthérique n'existe qu'en association avec les vaccins antitétanique et anti-pertussis. Il convient d'en tenir compte lors de l'évaluation des contreindications.
- **Contrôle de l'éradication du pathogène** : des frottis de contrôles (multi-sites) sont à réaliser : 1 naso-pharyngé, 1 frottis de gorge et des frottis de plaies (si présentes). Ceux-ci sont réalisés :
  - Au J1 et J2 après l'arrêt du traitement antibiotique : afin de permettre la levée de l'isolement, et vérifier l'élimination de la bactérie
  - Au J15 après arrêt traitement antibiotique : afin d'exclure les rares cas de rechutes tardives nécessitant une nouvelle cure d'antibiotique (si rechute, à discuter avec spécialiste en maladies infectieuses)

## - Mesures d'hygiène :

Il convient d'appliquer les [mesures d'hygiène générales](#) et les [mesures spécifiques aux maladies à transmission aérogène](#), disponibles sur ce site.

En particulier : tousser et éternuer de manière hygiénique, se moucher régulièrement au moyen de mouchoir en papier jetable, assurer une bonne aération des locaux, se laver fréquemment les mains, surtout après contact avec des sécrétions respiratoires.

## - Précautions additionnelles :

Un isolement respiratoire est nécessaire dès la suspicion de diphthérie et est maintenu jusqu'à confirmation du diagnostic. En cas de diphthérie cutanée, un isolement mécanique des plaies devra être également être mis en place :

### ▪ **Diphthérie ORL** (*C. diphthériae*, *C. ulcerans*, *C. pseudotuberculosis*):

#### ○ Isolement respiratoire (type gouttelettes) :

Maintenu jusqu'à obtention de deux cultures négatives (frottis nasopharyngé et frottis de gorge) à 24h d'intervalle post traitement antibiotique (J1 et J2 post arrêt antibiothérapie)

#### ○ Isolement mécanique (précautions de contact) si plaie(s) cutanée(s) chronique(s) :

Pourra être levé si un frottis de la plaie, réalisé avant la mise sous antibiotique, revient négatif.

Si positifs ou non disponibles, maintenir jusqu'à obtention de deux cultures négatives (frottis plaie) à 24h d'intervalle post traitement antibiotique (J1 et J2 post arrêt antibiothérapie)

### ▪ **Diphthérie cutanée** (*C. diphthériae*, *C. ulcerans*, *C. pseudotuberculosis*):

#### ○ Isolement mécanique (précautions de contact):

Maintenu jusqu'à obtention de deux cultures négatives (frottis plaie) à 24h d'intervalle post traitement antibiotique (J1 et J2 post arrêt antibiothérapie)

#### ○ Isolement respiratoire (type gouttelettes) :

Pourra être levé si les frottis de dépistage (frottis nasopharyngé et de gorge), réalisés avant la mise sous antibiotique, reviennent négatifs.

Si positifs ou non disponibles, maintien de l'isolement jusqu'à obtention de deux cultures négatives à 24h d'intervalle post traitement antibiotique (J1 et J2 post arrêt antibiothérapie)

L'éviction suit les règles de l'isolement.

## ***8. Prise en charge de l'entourage du patient (post-exposition)***

### **Prophylaxie :**

Il convient dans l'identification des personnes à risque de distinguer les infections ORL ou cutanées. Les **mesures prophylactiques ne seront envisagées qu'en cas de mise en évidence de toxine chez le cas index**. En plus des mesures d'hygiène/isolement requises (cfr paragraphe suivant), la prise en charge de l'entourage du cas comporte 4 volets : identification des contacts à risque, prélèvements microbiologiques des contacts identifiés, antibioprofylaxie, vaccination et contrôle de l'éradication du pathogène. Ceux-ci sont repris dans l'algorithme ([annexe 4](#)).

### **■ Identification des contacts à risque :**

- Si le cas index présente une **infection ORL**, les contacts considérés à risque sont ceux exposés entre les 7 jours précédents le début des signes cliniques et les 48 h après le début des antibiotiques chez :
  - Les personnes vivant sous le même toit ou ayant passé  $\geq 4$  heures dans le même lieu confiné (voyage en transport en commun)
  - Les personnes ayant eu des contacts intimes avec le cas index (relations sexuelles, baiser)
  - Le personnel de santé exposé aux sécrétions oro-pharyngées ou ayant réalisé des manœuvres invasives (intubation, réanimation) sans protection
  - Le milieu collectif ou professionnel du cas index : à envisager au cas par cas
- Si le cas index présente une **infection cutanée**, les contacts exposés depuis l'apparition de la plaie qui sont considérés à risque sont :
  - Les personnes vivant sous le même toit
  - Les personnes ayant eu des contacts intimes avec le cas index (relations sexuelles, baiser)
  - Le personnel de santé ayant réalisé les soins de plaie du cas index sans protection
  - Le milieu collectif ou professionnel du cas index : à envisager au cas par cas
- Les personnes ayant eu des contacts avec la source animale suspectée (valable uniquement pour les cas de *C. ulcerans*)

### **■ Prélèvements microbiologiques des contacts identifiés**

- Echantillon naso-pharyngé et de gorge pour culture et frottis de plaies si présentes

### **■ Traitement antibiotique prophylactique lors d'un contact à risque:**

L'antibioprofylaxie est nécessaire pour rompre la chaîne de transmission (éradication du portage).

- En cas de ***C. diphtheriae* tox+** (forme ORL ou cutanée) chez le cas index : le traitement antibiotique prophylactique sera administré immédiatement (sans attendre le résultat de leur dépistage) à toutes les personnes ayant eu un contact à risque **ET** qui sont non ou incomplètement vaccinés contre la diphtérie. Ce traitement prophylactique sera interrompu si les frottis de dépistage reviennent négatifs.
- En cas de ***C. ulcerans* tox+** (forme ORL) chez le cas index : le traitement antibiotique prophylactique sera administré immédiatement (sans attendre le résultat de leur dépistage) à toutes les personnes ayant eu un contact à risque et remplissant au moins une des conditions suivantes :
  - Etre à risque de développer une forme grave (ex immunodéprimé)
  - Personnel de santé non ou incomplètement vacciné contre la diphtérie



en contact avec des sujets à risque de développer une forme grave.

Ce traitement prophylactique sera interrompu si les frottis de dépistage reviennent négatifs et/ou tox-.

- **Dans les autres situations (par exemple, forme cutanée avec *C. ulcerans*),** l'antibioprophylaxie sera administrée au sujet exposé à un contact à risque uniquement si son dépistage revient positive pour une souche tox+.

- **Schémas proposés dans l'[AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9503](#) :**

Schéma 1 :

Options

**Azithromycine** : voie orale durant 3 jours

- Adulte : 500 mg/j pendant 3 jour.
- Enfants : 10 mg/kg/j pendant 3 jours

Schéma facile. L'antibiotique va agir 7-10jours (longue demi-vie)

OU

**Clarithromycine** par voie orale durant 7 jours :

- Adultes : 500 mg 2 fois par jour durant 7 jours ;
- Enfants : 7,5 mg/ kg. 2 fois par jour durant 7 jours.

Schéma plus long mais permettant d'interrompre l'antibioprophylaxie en cas de résultat revenant négatif (moins de risque de sélection d'antibio-résistance)

Schéma 2 : Contacts proches chez qui une compliance à l'antibiothérapie est incertaine :

**Benzathine penicillin G** par voie intramusculaire :

- 600 000 IU, en dose unique pour patients de < 30kg.
- 1.2 MIU, en dose unique pour patients de ≥ 30 Kg.

- **Contre-indications de l'antibioprophylaxie et remarques :**

- Délai maximal d'administration de l'antibioprophylaxie : 7 jours après le dernier contact avec le malade (sur base de la période d'incubation maximale) ;
- Il convient de tenir compte des effets secondaires et des interactions médicamenteuses avant toute administration ;
- En particulier, il convient d'éviter l'antibioprophylaxie en cas d'antécédents allergiques sérieux vis-à-vis d'un des composants de l'antibiotique.
- **En cas d'identification d'un porteur asymptomatique d'une souche tox+ parmi les contacts, en plus de l'antibioprophylaxie, l'évaluation de ses propres contacts à risque est nécessaire, suivant la même procédure que pour le cas index.**
- Prise en charge d'un porteur ou cas présentant une souche avec gène tox non fonctionnel (culture positive, pcr gène tox positif mais test Elek négatif) : une antibiothérapie est toujours indiquée mais sera adaptée à la présentation clinique (à discuter au cas par cas). La vaccination et le contrôle de l'éradication devra être réalisé comme pour les autres cas. Par contre, la déclaration n'est pas nécessaire et le dépistage ou l'antibioprophylaxie de l'entourage n'est pas indiqué.

- **Vaccination** : tous les contacts proches considérés exposés doivent recevoir une dose de vaccin (DTP pour les enfants DTP pour les adultes) sauf si on peut documenter une vaccination d'au moins 3 doses avec une dernière injection datant de moins de cinq ans.  
Les sujets non ou incomplètement vaccinés recevront ultérieurement les doses additionnelles pour compléter le calendrier vaccinal.
- **Contrôle de l'éradication du pathogène** : des frottis de contrôle (nasopharyngé, gorge +/- plaie) doivent être réalisés au J15 post arrêt de l'antibioprophylaxie. Si persistance positivité, à priori reprise de l'antibioprophylaxie (discussion avec spécialiste en maladies infectieuses préconisé)

### - Mesures d'hygiène :

Il convient d'appliquer les [mesures d'hygiène générale](#) et [mesures spécifiques aux maladies à transmission aérogène](#), disponibles sur ce site.

En particulier : Tousser dans un mouchoir jetable et éternuer dans un mouchoir jetable ou au niveau du pli du coude, se moucher régulièrement au moyen de mouchoir en papier jetable, assurer une bonne aération des locaux, se laver fréquemment les mains, surtout après contact avec des sécrétions respiratoires.

Appliquer les mesures d'hygiène spécifiques aux maladies à transmission directe en cas de diphtérie cutanée.

### - Précautions additionnelles :

En cas d'identification d'un porteur asymptomatique d'une souche tox+ parmi les contacts, les mêmes critères d'isolements que pour un cas symptomatique sont d'applications

### - Collectivité à risque :

En collectivité, il est nécessaire d'informer le personnel et les parents de l'existence de cas dans la collectivité.

La surveillance des personnes à risque de développer une forme grave (personnes immunodéprimées, adultes et femmes enceintes mal vaccinés ou non-vaccinés) s'impose. Elle durera au moins le temps nécessaire à l'incubation, c'est-à-dire de 7 jours.

Dans tous les cas, il a lieu de contacter l'inspecteur régional de l'AVIQ.

## 9. Prévention pré-exposition

### - Mesures préventives générales :

Il convient d'appliquer les [mesures d'hygiène générale](#) et [mesures spécifiques aux maladies à transmission aérogène](#), disponibles sur ce site.

### - Prophylaxie :

N/A

### - Vaccination :

Le vaccin est constitué d'un toxoïde (obtenu en dénaturant la toxine diphtérique par le formaldéhyde) adsorbé sur de l'hydroxyde d'aluminium comme adjuvant (facteur immunologique co-stimulant). Le vaccin antidiphtérique n'existe pas sous forme monovalente mais uniquement sous forme de vaccin combiné (associée à la coqueluche et/ou à la poliomyélite).

Après une vaccination complète dans l'enfance, l'immunité résiduelle diminue toutefois progressivement. Une absence d'immunité chez les adultes a contribué à une recrudescence de la diphtérie en Europe de l'Est dans les années 90 du siècle dernier. Le nombre croissant de personnes voyageant dans les pays en développement où la diphtérie est encore présente constitue un argument important qui plaide en faveur du maintien d'un programme de vaccination et de la nécessité de vaccination de rappel tous les dix ans.

Les vaccins antidiphtérique et antitétanique sont constitués des anatoxines (dénaturées par le formaldéhyde) diphtérique et tétanique. Selon l'âge, deux dosages des anatoxines tétanique (40 et 20 UI) et diphtérique (30 et 2 UI) sont utilisés. Les vaccins comportant le dosage le plus élevé peuvent être administrés jusqu'à l'âge de 12 ans. Au-delà de l'âge de 12 ans, les vaccins à dosage réduit sont recommandés.

Une primo-vaccination complète contre la diphtérie chez l'adulte nécessite trois injections: deux injections à 4-6 semaines d'intervalle suivies d'une 3ème injection 6 mois à 1 an après la deuxième injection.

Après une vaccination de base complète, les vaccinations de rappel sont recommandées à intervalle de 10 ans sans limite d'âge. Lorsque la dernière injection - chez un sujet complètement vacciné antérieurement - remonte à plus de 20 ans, une revaccination complète comportant 3 doses n'est pas nécessaire, mais 2 injections à 6 mois d'intervalle sont recommandées (la deuxième injection est utile pour assurer une protection de bonne qualité et de longue durée).

L'utilisation d'un dosage pédiatrique de toxoïde diphtérique (30 UI) chez un sujet possédant déjà une immunité peut provoquer de sévères réactions immunologiques. Pour cette raison, en cas de vaccination de rappel ou de rattrapage, à partir de l'âge de 13 ans, un vaccin à dosage réduit sera utilisé (> 2 UI de toxoïde diphtérique).

Vaccination de rattrapage antidiphtérique et antitétanique à partir de l'âge de 8 ans (associée à la coqueluche et/ou à la poliomyélite).

#### Effets indésirables et contre-indications vaccin dT :

Rougeur, induration et douleur au site d'injection sont fréquemment rapportées mais disparaissent rapidement et ne nécessitent généralement aucun traitement. Occasionnellement, une poussée de température peut y être associée. La grossesse ne constitue pas une contre-indication.

Pour une description complète, nous nous référons à la notice pour le public de l'AFMPS et aux données générales du CBIP concernant les vaccins :

<http://www.fagg-afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/notices/>

[http://www.cbip.be/GGR/Index.cfm?ggrWelk=/GGR/MPG/MPG\\_L.cfm](http://www.cbip.be/GGR/Index.cfm?ggrWelk=/GGR/MPG/MPG_L.cfm)



Wallonie

**AViQ**

Agence pour une Vie de Qualité

Familles Santé Handicap

# Diphthérie

 sciensano

## Personnes de contact

### **Centre National de référence**

#### **Centre de Référence *Corynebacterium diphtheriae* et autres corynébactéries toxigènes**

UZ Brussel - Microbiologie en Ziekenhuishygiëne

Personne de contact: Prof. Dr. D. Piérard

Adresse: Laarbeeklaan 101, 1090 Jette

Tel.: 02/477 50 00

E-mail: [labomicro@uzbrussel.be](mailto:labomicro@uzbrussel.be)

[https://nrchm.wiv-isp.be/fr/centres\\_ref\\_lab/corynebacterium\\_diphtheriae/default.aspx](https://nrchm.wiv-isp.be/fr/centres_ref_lab/corynebacterium_diphtheriae/default.aspx)

### **Institut Scientifique de Santé Publique**

#### **SCIENSANO**

Service d'épidémiologie des maladies infectieuses

Personne de contact : Dr Chloé Wyndham-Thomas ou Dr Sophie Quoilin

Adresse : Rue J. Wytsman 14, 1050 Bruxelles

Tél : 02/642 57 47 ou 02/642 57 81

E-mail : [chloe.wyndham-thomas@sciensano.be](mailto:chloe.wyndham-thomas@sciensano.be); [sophie.quoilin@sciensano.be](mailto:sophie.quoilin@sciensano.be)



Wallonie

**AViQ**

Agence pour une Vie de Qualité

Famille Santé Handicap

# Diphtérie



## Annexes

### Annexe 1 : Tableau récapitulatif de prise en charge du cas index

Prise en charge du cas index		
MESURES GENERALES (communes)		
<b>Dépistage</b>	Toujours compléter les prélèvements multi-site si non réalisé initialement: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Frottis de gorge</li> <li>• 1 Frottis naso-pharyngé</li> <li>• Frottis de plaie(s) (si plaie chronique)</li> </ul> Si possible avant la mise sous antibiotique, et sous les membranes si présentes Prévenir le laboratoire de l'envoi. Si culture +, envoi au CNR (recherche toxines)	
<b>Hygiène</b>	Mesures d'hygiène générales et les mesures spécifiques à la transmission aéro-gène <u>Milieu hospitalier</u> : désinfection chambre en après l'hospitalisation <u>Domicile</u> : désinfection domicile	
<b>Traitement antibiotique</b>	Traitement antibiotique empirique dans tous les cas, à adapter à l'antibiogramme	
<b>Vaccination</b>	Vaccinations systématique en phase de convalescence (disparition des symptômes) N° de doses et timing selon historique vaccinal (pour schéma vaccinal complet)	
<b>Contrôle éradication</b>	Frottis de contrôles (multi-sites) à réaliser : <ul style="list-style-type: none"> <li>• J1 et J2 après arrêt du traitement antibiotique : afin de permettre la levée de l'isolement (cfr ci-dessous)</li> <li>• J15 après arrêt du traitement antibiotique : afin d'exclure les rares cas de rechutes tardives nécessitant une nouvelle cure d'antibiotique (si rechute, à discuter avec spécialiste en maladies infectieuses)</li> </ul>	
MESURES SPECIFIQUES (selon formes cliniques et l'espèce)		
	FORME ORL	FORME CUTANEE
<b>Isolement-éviction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Isolement respiratoire</b> (type gouttelettes) : <u>Maintenu</u> jusqu'à obtention de deux cultures négatives (frottis naso-pharyngé et de gorge) à 24h d'intervalle post traitement antibiotique (J1 et J2 post arrêt antibiothérapie)</li> <li>• <b>Isolement mécanique</b> (précautions de contact) si plaie cutanée chronique : <u>Maintenir</u> jusqu'à obtention de deux cultures négatives (frottis plaie) à 24h d'intervalle post traitement antibiotique (J1 et J2 post arrêt antibiothérapie)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Isolement mécanique</b> (précautions de contact) <u>Maintenu</u> jusqu'à obtention de deux cultures négatives (frottis plaie) à 24h d'intervalle post traitement antibiotique (J1 et J2 post arrêt antibiothérapie)</li> <li>• <b>Isolement respiratoire</b> (type gouttelettes): <u>Pourra être levé</u> si les frottis de dépistage (naso-pharyngé et gorge), réalisés avant la mise sous antibiotique, reviennent négatifs. <u>Si positifs ou non disponibles</u>, maintien de l'isolement jusqu'à obtention de deux cultures négatives à 24h d'intervalle post traitement antibiotique (J1 et J2 post arrêt antibiothérapie)</li> </ul>
<b>Activation procédure antitoxine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dès suspicion clinique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uniquement indiqué si Tox + et manifestations systémiques</li> </ul>



Wallonie

# AViQ

Agence pour une Vie de Qualité

Familles Santé Handicap

# Diphtérie

sciensano

## Annexe 2 : Procédure de commande antitoxine antidiphtérique

### Commande diphtérie antitoxine auprès du Centre Antipoison

1. L'hôpital (médecin infectiologue) contacte l'inspecteur régional en charge de la surveillance des maladies infectieuses qui délibère avec l'infectiologue (tox + ou non)
2. L'inspecteur d'hygiène informe le médecin de garde de vigilance sanitaire et délibère avec lui
3. Si accord, l'inspecteur d'hygiène contacte le centre antipoison et délibère sur le transport
4. Le centre antipoison adapte les données de stock et en informe la vigilance sanitaire

(Le centre antipoison dispose d'une liste des personnes nommées par les communautés/régions autorisées à commander l'antitoxine diphtérique au niveau du centre antipoison. Cette liste est à mettre à jour sur base annuelle)



Wallonie

**AViQ**

Agence pour une Vie de Qualité

Familles Santé Handicap

# Diphthérie

## Annexe 3: Notice anti-toxines

### DIPHTHERIA ANTITOXIN I.P.

(For the use of only by a Registered Medical Practitioner or Hospital or Laboratory)  
**(LIQUID ENZYME REFINED EQUINE IMMUNOGLOBULINS)**

#### COMPOSITION:

Diphtheria Antitoxin, I.P. is a sterile solution containing enzyme refined Anti diphtheria equine immunoglobulin F(ab')<sub>2</sub> fragments as a clear and colorless to yellowish liquid for parenteral administration. It contains Glycine as a stabilizer, Sodium chloride as excipient and Cresol as preservative.

It is produced by pepsin digestion, heat inactivation at controlled temperature and Caprylic acid precipitation of hyper immune plasma derived from healthy equines immunized with Diphtheria toxoid.

#### INDICATION:

Diphtheria Antitoxin I.P. gives passive immunity to persons having no or minimal immunity against the toxin formed by *Corynebacterium diphtheriae*, the causative organism for Diphtheria.

#### DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Diphtheria Antitoxin is recommended for treatment of Diphtheria and in rare circumstances, for prophylaxis in unimmunized persons who were exposed to Diphtheria. Diphtheria Antitoxin is given as soon as clinical evidence of diphtheria appears without waiting for bacterial isolation as patient condition may deteriorate rapidly. The therapeutic dose is determined by site & size of membrane formation, severity and duration of disease. Antibiotics can stop spread of bacteria and eliminate them, however, it cannot neutralize diphtheria toxin and hence is not a replacement of antitoxin.

**For prophylaxis** - The use of diphtheria antitoxin is generally not recommended for prophylaxis as its protective effect is of short duration (1 to 2 weeks only) and furthermore, it may cause sensitization to horse sera. When it is considered necessary, the dose depends on time since exposure, clinical condition and the extent of exposure. Usually a dose of 5000 to 10000 I.U. is administered intramuscularly as a single dose to adults and children. In addition, the patient should receive active immunization by a dose diphtheria toxoid at different place along with antibiotics.

**For treatment** - The dose depends on the age, body weight, severity and duration of disease. The entire dose should be administered at one time. Any delay in administration may result in increased dose requirement and decreased effectiveness. The usual dose in adults and children is from 250 IU/kg to 1000 IU/kg depending on severity of disease. A dose of 10,000 to 30,000 I.U. of diphtheria antitoxin may be injected intramuscularly in mild to moderately severe cases of diphtheria and doses up to a maximum of 1,00,000 IU in severe cases can be given. In addition, antibiotics & corticosteroids may be administered.

#### ADVERSE REACTIONS:

Diphtheria antitoxin being derived from equines is heterologous to humans and hence the foreign proteins in the product can give occasional reaction such as pallor, sweating, nausea, vomiting, urticaria or fall of blood pressure, which could be countered immediately by injection of 1 ml. of 1:1000 adrenaline which should be always kept handy, before injecting the dose of Diphtheria antitoxin.

Every care should be taken to prevent these reactions. Before injection of Diphtheria antitoxin, it is necessary to enquire from the patient,

- 1) Whether he has had injections of any equine origin serum product previously.
- 2) Whether there is personal or family history of allergy, i. e. asthma, eczema or drug allergy.

In allergic individuals, the Diphtheria antitoxin can be injected 15 to 30 min. after administration of antihistamines, Hydrocortisone intramuscularly and 1 ml of Adrenaline 1:1000 may be injected intramuscularly at the same time as the antiserum. Administration of hydrocortisone or Adrenaline may be repeated, if necessary. In some cases symptoms such as itching, urticarial rash, pain in joints and muscles, fever, enlargement of lymph glands, appear about 7-12, days after injection of serum. These should be treated with antihistamines and corticosteroids. Usually these symptoms of serum sickness last a few days and patients recover without any complications.

#### HOW IT IS SUPPLIED:

Diphtheria Antitoxin-10,000 I.U. in 10 ml

#### STORAGE:

It should be stored at +2° C to +8° C  
Do not freeze.

#### CONTRAINDICATIONS AND PRECAUTIONS:

Proper precautions are necessary while dealing with persons with a known hypersensitivity to constituents of product. The predictability value and necessity of skin sensitivity test is controversial, however, it may be performed at the discretion of doctor. However, it may be performed at the discretion of doctor as follows-

- a. Inject 0.1 ml Diphtheria Antitoxin diluted 1:10 in physiological saline intra-dermally into the flexor surface of the forearm to raise a bleb of about 3-4 mm diameter.
- b. Inject an equal amount of normal saline as a negative control on the flexor surface of the other forearm.
- c. After 15 minutes, an increase in diameter to > 10 mm of induration surrounded by flare is taken as positive skin test, provided the reaction on the saline test was negative.
- d. An increase or abrupt fall in blood pressure, syncope, hurried breathing, palpitation and any other systemic manifestation should be taken as positive test.
- e. A negative skin test must never assure physician that no anaphylactic reaction will occur.



#### MANUFACTURED BY:


Premium Serums & Vaccines Pvt. Ltd.,  
S. No.354-1,354-2A/1, At & post-Narayangaon,  
Behind Champagne Indage, Tal. Junnar,  
Dist. Pune (M.S.) 410504, INDIA.  
[marketing@premiumserums.com](mailto:marketing@premiumserums.com)

#### MANUFACTURED AT:

Survey No.172, Part,  
Gagillapur, Quthbullapur,  
RR Dist.Telagana-500043, INDIA.

P18/ADS/D

## Annexe 4: algorithme de prise en charge de l'entourage



\* Contact animal (bovins, animaux domestiques etc) et consommation de produits laitiers non pasteurisés  
 † Une dose de vaccin (enfants DTP, adultes dTP) pour tous les contacts à risque, sauf si on peut documenter une vaccination d'au moins 3 doses avec une dernière injection datant de moins de cinq ans.  
 # Frottis contrôle J15 après l'arrêt de la prophylaxie. Si contrôle positif, reprise antibioprofylaxie (à discuter avec spécialiste)





Wallonie

**AViQ**

Agence pour une Vie de Qualité

Familles Santé Handicap

# Diphthérie



## Références

- Vaccine-preventable Diseases: Monitoring System, country profile: Belgium. Organisation, Mondial de la Santé (OMS). [Consulté le 16/04/2014]. Disponibilité sur internet : [http://apps.who.int/immunization\\_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=BEL&commit=OK](http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=BEL&commit=OK)
- Galazka AM, Robertson SE, Oblapenko G. Resurgence of diphtheria. Eur J Epidemiol 1995; 11: 95-105.
- Wagner KS *et al.* Screening for *Corynebacterium diphtheriae* and *Corynebacterium ulcerans* in patients with upper respiratory tract infections 2007-2008: a multi-centre European study. Clin Microbiol Infect 2011; 17(4): 519-25.
- Wagner KS *et al.* Diphtheria in the United Kingdom, 1986-2008. The increasing role of *Corynebacterium ulcerans*. Epidemiol Infect 2010; 138(11): 1519-30.
- Hogg RA, Wessels J, Hart J, Efstratiou A, De Zoysa A, Mann G, Allen T, Pritchard GC. Possible zoonotic transmission of toxigenic *Corynebacterium ulcerans* from companion animals in a human case of fatal diphtheria. Vet. Rec 2009; 165: 691-2.
- Taylor J, Saavedra-Campos M, Harwood D, Pritchard G, Raphaely N, Kapadia S, Efstratiou A, White J, Balasegaram S. Toxigenic *Corynebacterium ulcerans* infection in a veterinary student in London, United Kingdom, May 2010. Euro Surveill. 2010; 15(31): 19634.
- Bonmarin I *et al.* Diphtheria: a zoonotic disease in France. Vaccine 2009; 27: 4196-4200.
- European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Définition de cas de diphthérie [en ligne]. Disponibilité sur internet : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:159:0046:0090:FR:PDF>
- Edmunds WJ, Pebody RG, Aggerback H, Baron S, Berbers G, Conyn-van Spaendonck MA, Hallander HO, Olander R, Maple PA *et al.* The sero-epidemiology of diphtheria in Western Europe. ESEN Project. European Sero-Epidemiology Network. Epidemiol Infect. 2000; 125(1):113-25.
- Neal, S. and A. Efstratiou, DIPNET - establishment of a dedicated surveillance network for diphtheria in Europe. Euro Surveill, 2007. 12(12): E9-E10.
- Wagner J. *et al.* Infection of the skin caused by *Corynebacterium ulcerans* and mimicking classical cutaneous diphtheria. CID 2001; 33: 1598-1600.
- Van Damme P, Theeten H, Braeckman T, Lernout T, Hens N, Hoppenbrouwers K, Roelants M. Studie Vaccinatiegraad in Vlaanderen 2012. Januari 2013.
- Vaccinatiegraad bij baby's en adolescenten. Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid [Consulté le 16/04/2014]. Disponibilité sur internet : <http://www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinatiegraad/#vaccinatiegraadstudie>
- Robert E, Swennen B. Enquête de couverture vaccinale des enfants de 18 à 24 mois en région de Bruxelles-Capitale, décembre 2012, ESP-ULB. [Consulté le 16/04/2014]. Disponibilité sur internet : <http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-enquete-couverture-vaccinale-2012.xml>
- Lartigue MF, Monnet X, Le Flèche A, Grimont PA *et al.* *Corynebacterium ulcerans* in an immunocompromised patient with diphtheria and her dog. J Clin Microbiol. 2005 ; 43 (2) : 999-1001.
- Theeten H, Hutse V, Hens N, Yavuz Y, Hoppenbrouwers K, Beutels P, Vranckx R, Van Damme P. Are we hitting immunity targets? The 2006 age-specific seroprevalence of measles, mumps, rubella, diphtheria and tetanus in Belgium. Epidemiology and Infection, 2002; 139, pp 494-504. doi:10.1017/S0950268810001536.
- Wagner KS *et al.* A review of the international issues surrounding the availability and demand for diphtheria antitoxin for therapeutic use. Vaccine 2010; 28:14-20.



Wallonie

# AViQ

Agence pour une Vie de Qualité

Familles Santé Handicap

## Diphthérie



- Conduite à tenir lors de l'apparition d'un cas de diphthérie. [Consulté le 16/04/2014]. Haut Conseil de la Santé Publique, 2011. [en ligne]. Disponibilité sur internet : <http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=215>
- Instruction n° DGS/R11/2011/348 du 30 août 2011 relative à la conduite à tenir lors de l'apparition d'un cas de diphthérie. Site santé du Ministère des Affaires sociales et de la santé, 2011.
- Rousseau C, Belchior E, Broche B, Badell E, Guiso N, Laharie I, Patey O, Lévy-Bruhl D. Diphtheria in the south of France, March 2011. Euro Surveill. 2011;16(19): 19867.
- Amanna IJ, Carlson NE, Slifka MK. Duration of humoral immunity to common viral and vaccine antigens. N Engl J Med 2007; 357(19) : 1905-1915.
- Basnyat B. Death due to diphtheria. J Travel Med 1998; 5(2) : 101.
- CDC yellow book. Chapter 3 Infectious diseases related to travel: Diphthéria, by Tejpratap S. P. Tiwari. Available at: <https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectious-diseases-related-to-travel/diphtheria>
- Control of Communicable Diseases Manual. David L Heymann. 19th edition
- [http://www.who.int/immunization/policy/position\\_papers/diphtheria/en/](http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/diphtheria/en/)
- [http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2017/april/1\\_Final\\_report\\_Clarke\\_april3.pdf](http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2017/april/1_Final_report_Clarke_april3.pdf)
- Völzke H1, Kloker KM, Kramer A, Guertler L, Dören M, Baumeister SE, Hoffmann W, John U. Susceptibility to diphtheria in adults: prevalence and relationship to gender and social variables. Clin Microbiol Infect. 2006 Oct;12(10):961-7.
- Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L; Health Care Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. Am J Infect Control. 2007 Dec;35(10 Suppl 2):S65-164.